

※ 考生請注意：本試題不可使用計算機。請於答案卷(卡)作答，於本試題紙上作答者，不予計分。

一、選擇題:(每題 4 分，共 40 分)

1. 有關約束過程的注意事項，下列何者有誤？

- A. 執行約束過程，會有 1 位團隊領導人指揮，通常是醫師或資深護理師。
- B. 至少 4-5 人，每人各自責任區分。
- C. 執行約束後，盡可能讓病人平躺，以免病人身體有空隙掙扎而造成受傷。
- D. 由團隊領導人向病人解釋為什麼他將要被約束，並分散病人注意力。

2. 有關解除約束的注意事項，下列何者有誤？

- A. 解除約束至少需要 3-4 位工作人員共同處理，由醫師評估解約束的合適性。
- B. 解除約束過程，因病人情緒改善，不需特別注意即可解除約束。
- C. 解除約束先解除下肢約束再解上肢，下肢需有工作人員扶住大關節。
- D. 解除約束後，需跟病人會談，肯定病人的情緒控制，並鼓勵保持。

3. 下列何種藥物在使用初期需每星期抽血檢查顆粒性白血球數目？

- (A) Olanzapine (B) Clozapine (C) Risperidone (D) Quetiapine

4. 下列何種藥物，因可能造成致命性的皮膚過敏反應(Stevens-Johnson syndrome)，在使用之前必須先抽血確定病患未帶 HLA-B*1502 基因？(A) Lithium (B) Valproic Acid (C) Carbamazepine (D) Lamotrigine

5. 關於鋰鹽(Lithium)使用的衛教，下列何者為非？(A) 1+2 (B) 2+3 (C) 1+4 (D) 2+3+4

- (1). 必須定期追蹤肝臟功能
- (2). 必須定期追蹤甲狀腺功能
- (3). 孕婦不宜使用鋰鹽
- (4). 因劇烈運動、大量流汗、或拉肚子，會影響藥物血中濃度，此時需增加劑量
- (5). 嚴重鋰鹽中毒可能引發大發作癲癇

6. 有關電氣痙療法(electroconvulsive therapy)的描述，何者正確？a 適用對象針對嚴重難治的思覺失調症病人和強烈自殺傾向的憂鬱症病人 b 誘導痙攣的型態是先強直期，之後伴隨陣攣，引發時間至少維持 30 秒最理想 c 認知功能退步是不可逆的 d 大部份出現的副作用是記憶力喪失 (A) abc (B) abd (C) acd (D) bcd

7. Y 先生被診斷為雙相性情感障礙第一型-躁症(Bipolar I disorder, manic)入院後出現暴力攻擊，情緒易變、高昂，口出威脅，請問其可能接受以下何類藥物治療？a 抗憂鬱劑 b 情緒穩定劑 c 抗癲癇藥物 d 中樞神經刺激劑 (A) ab (B) bc (C) cd (D) bd

8. 服用 BZD 藥物的注意事項何者錯誤？(A) 不會產生呼吸抑制 (B) 因嗜睡會影響白天活動 (C) 不會產生耐受性 (D) 突然停藥會有戒斷症狀

9. 小文出現大聲罵人、攻擊人的行為，並常摀住耳朵叫道：不要再說了，治療藥物為 Risperidol，對於此類藥物治療之敘述，下列何者為非？(A) 宜先評估病患血糖；(B) 有可能會有體重增加、肥胖問題；(C) 該藥物可同時治療病患的正負性症狀；(D) 易造成錐體外徑症候群。

10. 精神病患強制住院鑑定應由何人為之？

- (A) 一位專科醫師 (B) 兩位專科醫師
- (C) 一位專科醫師及一位專科護理師 (D) 一位精神科主任

二、是非題(每題2分，共10分)

1. Personal Recovery 指復原是個人化，恢復到原來病前的功能。
2. 幫助患有精神疾病的朋友們復元，已經是精神健康、醫療、與復健體系的普世價值。
3. 從精神疾病復元、帶病生活仍是「不容易而少有的」案例。
4. 社區復健是台灣目前最主要的精神復健模式，目前提供服務的質量均優。
5. 科學多已證明疾病或特殊行為多為遺傳與環境以及二者互動所造成的 ($Y = G + E + G \times E$)

三、申論題(50%)

依照您過往經驗，在照顧精神科病人過程中，您通常都發揮「哪些」精神衛生護理角色功能(15%)? 您「如何」發揮這些精神衛生護理角色功能(15%)? 請同時舉實際的照顧案例說明(20%)。