

※ 考生請注意：本試題不可使用計算機。請於答案卷(卡)作答，於本試題紙上作答者，不予計分。

一、選擇題：請選出最適當的答案，每題4分，共16分。

1. 下列何者並非思覺失調症(schizophrenia)的負性症狀(negative symptoms)？

- (A)缺乏動機或無法持續日常生活
- (B)對社交關係沒有興趣
- (C)缺乏外顯的情緒表達
- (D)胡言亂語

2. 使用酒精後，其作用於大腦的神經系統而產生短期效果，以下何者敘述有誤？

- (A)通過刺激 GABA 受器，降低緊張感
- (B)酒精會增加 serotonin，產生愉悅感
- (C)酒精會抑制 glutamate 受器，導致思考變慢
- (D)酒精會刺激 dopamine 的釋放，增強短期動作功能

3. 關於情緒障礙症的描述何者錯誤？

- (A)推估鬱症的遺傳大約是 20%，第一型雙相情緒障礙症的遺傳是 59%
- (B)重鬱發作前常有壓力生活事件
- (C)有些鬱症個案的皮質類固醇無法抑制皮質醇分泌
- (D)血清素的受器敏感度減低與憂鬱及躁症有關

4. 下列關於阿茲海默症(Alzheimer's disease)的病理敘述，何者為非？

- (A)大腦中有較多的 β -類澱粉蛋白沉積(beta-amyloid plaques)
- (B)早期小腦較不受影響
- (C)最早萎縮的腦區是頂葉
- (D)腦室會擴大

二、問題題(共五題，84分)

1. 請說明 Minnesota Multiphasic Personality Inventory—2 (MMPI-2)的編制理論與優缺點。Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI)可被用來區辨 DSM-5 的人格障礙症。許多研究探討 MMPI-2 與 MCMI (Millon Clinical Multiaxial Inventory) 的聚斂效度，這些研究指出在那些類型的人格障礙症(personality disorder)有高的聚斂效度？而在那些類型的人格障礙症上有低的聚斂效度？(18分)
2. 請說明行為規範障礙症(conduct disorders)的診斷準則、分類、註明特殊狀況，以及目前嚴重度的分類。並請說明兩種具有實徵研究支持且最有效的社會心理治療方法名稱與治療內容。(15分)
3. 請列舉出國內自殺防治作為的一些方式(8分)，並舉其中一種作為為例，從學理觀點來探討其為何有效或無效。(10分)
4. 請舉出三種臨床心理學 (或變態心理學、或偏差心理學) 領域中常提到有那些異常行為很容易受到文化與次文化因素影響，其影響範圍為何？(16分)
5. 請問何謂 Major Neurocognitive Disorder(Major NCD)？何謂 mild neurocognitive disorder(Mild NCD)？Major NCD 與 Mild NCD 的差異為何？(17分)