

※ 考生請注意：本試題 可 不可 使用計算機

選擇題：(15 分，每題 3 分)

- 1、對於老年病患藥物的使用原則，以下何者為非？
 - A. 危險性較高的藥物宜從低劑量開始使用
 - B. 注意詢問藥物的順從性及注意服藥後的身體不適情形
 - C. 病患發生任何不適時，應先考慮是藥物引起的不良反應
 - D. 發生藥物不良反應時，應加上另一種藥物，以減輕症狀

- 2、DSM-IV 對於譫妄的診斷要點，以下何者不是？
 - A. 急性發作併有起伏的病程(acute onset with a fluctuating course)
 - B. 不適當的行為(inappropriate behavior)
 - C. 意識狀態改變(Alteration in the level of consciousness)
 - D. 注意力不集中(inattention)

- 3、關於老年失智症(Alzheimer's disease)的敘述以下何者為真？
 - A. 一般從記憶退化開始
 - B. 病程呈階梯型惡化
 - C. 多會有局部神經學症狀
 - D. 急性發作，快速惡化

- 4、下列有關老人使用手杖的敘述，何者是錯誤的？
 - A. 手杖的長度應在垂直置放地上時，高及使用人的下肢大轉子部位
 - B. 如用仰臥床上測量法，在手持手杖平置身側時，手杖之長度應比鞋底長出一英寸
 - C. 老人手持手杖時，肘關節應該有 5-10 度的屈曲彎度
 - D. 如為減輕一側疼痛腳之載重而持手杖時，應該以疼痛腳對側之手持杖而行

- 5、關於老年人的發燒，以下何者為非？
 - A. 老年人感染的部位，以呼吸道感染為最常見。
 - B. 老年人因結締組織疾病引起不明熱的原因中，仍以紅斑性狼瘡為最常見
 - C. 長期照護機構的老年人，若比原本的基礎體溫持續升高 2°F(1.1°C)時，即可視為發燒。
 - D. 長期照護機構的老年人，若重複測量的口溫均高於 99°F(37.2°C)時，可視為發燒。

系所組別：老年學研究所丙組

考試科目：老年醫學

考試日期：0307，節次：2

※ 考生請注意：本試題 可 不可 使用計算機

問答題：(85 分)

- 1、請敘述周全性老年醫學評估(comprehensive geriatric assessment)的內容。(25 分)
- 2、請比較譫妄、老年失智症及憂鬱症的差異。(15 分)
- 3、請詳述老年人尿失禁的分類。(10 分)
- 4、若您去居家訪視獨居長者時，得知他最近曾發生跌倒的情形時，接下來該如何進一步詳細評估這位長者？(15 分)
- 5、請條列出與老年病人的溝通要領。(10 分)
- 6、請敘述老年人健康問題的特徵。(10 分)